

何謂登革熱？

- 登革熱俗稱「天狗熱」或「斷骨熱」。
- 是一種藉由病媒蚊叮咬而傳播的急性傳染病，不會由人直接傳染給人。
- 可分為典型登革熱及登革出血熱。

●典型登革熱的臨床症狀

發燒(38°C 以上)、骨頭關節、肌肉及後眼窩痛、發燒3-4天後皮膚出紅疹(如下面之手臂及頭)。



●登革出血熱的臨床症狀

有出血現象，處理不當時會有10%至50%之死亡率。



懷疑自己感染登革熱怎麼辦？


- 看醫生
 - 避免白天被病媒蚊叮咬
- 外出著淺色長袖衣褲
裸露處噴防蚊液(但請按標籤說明使用)
睡覺時吊掛蚊帳
避免前往雜亂陰暗蚊蟲孳生的地方

感染登革熱怎麼辦？


- 多休息、多喝水。
- 與醫師充分合作並遵照醫師的指示服藥，大約一星期後就能逐漸康復。
- 於發病前一日及後五日內，體內血液含有登革熱病毒，應避免被登革熱病媒蚊叮咬，以免病毒擴散，危及家人及鄰居之健康。
- 清除居家環境內外各類積水容器，不使病媒蚊孳生。

台灣傳播登革熱的病媒蚊

● 埃及斑蚊



● 白線斑蚊



斑蚊棲息場所及吸血習性

● 埃及斑蚊

喜歡棲息於室內，尤其是深色之窗簾、衣服、布幔及其他陰暗處所。

● 白線斑蚊

喜歡棲息於室外孳生棲所附近之植物及戶外之陰涼處所

● 吸血高峰

斑蚊在白天吸血，以早上9-10時及下午 4-5時為吸血高峰。

斑蚊的孳生源 (依孳生源的所在位置)

● 室內

花瓶
花盆底盤
陶缸
水泥槽
水桶
冰箱底盤
飲水機底盤
烘碗機底盤
植物葉軸

● 室外

所有可積水之
瓶瓶罐罐



如何預防登革熱？

- 目前登革熱尚無有效的疫苗可以預防。
- 清除積水容器，杜絕病媒蚊孳生，是防治登革熱的根本方法。

沒有病媒蚊孳生源，就沒有病媒蚊。
沒有病媒蚊，就不會發生登革熱。

- 病媒蚊對於叮咬對象並無選擇性
- 一旦校園內發生登革熱病例，則校園內每一個人都有被感染的機會
- 校園經常維持無病媒蚊孳生的最佳環境，就不必擔心校園發生登革熱流行。